



CAROTA

Resa produttiva:

500-700 q.li/ha

Asportazione teorica elementi nutritivi (kg/q.le):

N 0,3 • P₂O₅ 0,15 • K₂O 0,5

Importanza degli elementi nutritivi per la coltura

Boro (B)	Rame (Cu)	Ferro (Fe)	Manganese (Mn)	Molibdeno (Mo)	Zinco (Zn)	Magnesio (Mg)	Calcio (Ca)	Zolfo (S)	Potassio (K)
XXX	XX	X	XX	X	X	XXX	XX	X	XX

Aziende CON impianto di fertirrigazione

CONCIMAZIONE GRANULARE PRIMA DELLA SEMINA

UNISLOW 17.17.17+2 o 22.12.16+2

250-400 kg/ha

oppure

QROP MIX 13.18.24 + 2

250-400 kg/ha

IN FERTIRRIGAZIONE

fase fenologica	prodotto		dose (kg/ha) intervento	note
Sviluppo vegetativo, produzione	UNISOL 15.5.30 + FULVIN	ULTRASOL 14.7.28 + FULVIN	23-35 5-10	Interventi ogni 7-10 giorni

Aziende SENZA impianto di fertirrigazione

CONCIMAZIONE GRANULARE

fase fenologica	prodotto	dose	note
Alla preparazione del terreno	LETAME	200-400 q.li/ha	
Presemina	UNISLOW 22.12.16+2 o UNISLOW 17.17.17+2 o QROP MIX 13.18.24+2	400-500 kg/ha	
In copertura	Qrop K plus 12.0.46	250-350 kg/ha	

ARPA Speciali srl, via Cremona 27/5 – 46100 Mantova tel. 0376 262483 info@arpaspeciali.com

SOLO PER USO INTERNO. VIETATA OGNI RIPRODUZIONE. Le indicazioni sopra riportate sono indicative e Arpa Speciali srl si riserva di apportare in qualsiasi momento senza preavviso le modifiche che ritenesse utili per qualsiasi esigenza tecnico commerciale e/o legislativa. Arpa Speciali srl non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni o esiti parziali derivanti da impieghi non corretti o difformi dalle Buone Pratiche Agricole e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite circa l'utilizzo dei propri prodotti. **v200311**



Interventi specifici


Obiettivo	Prodotti	Dose	Epoca di utilizzo			
			Prime foglie	2-4 foglie	6-8 foglie	Ingrossamento fittone
CON BASSE TEMPERATURE E COLTURA STENTATA	GORFRUT o JISAMAR	2,5 lt/ha				
		2 lt/ha				
Interventi a distanza di 7-10 giorni						
IN PREVENZIONE DELLA CLOROSI E DI CARENZE DI MICROELEMENTI	SPINNER	1 kg/ha				
	GLYBET	2 lt/ha				
Interventi a distanza di 7 giorni						
PREVENZIONE SPACCATURE DEL FITTONE PER CARENZA DI BORO	BORONPLUS	1 lt/ha				
	Nella fase di 6-8 foglie e dopo 10 giorni					
PER AUMENTARE LA PRODUZIONE E LA QUALITA'	MAGyK ZM	4 kg/ha				
	FULVIN	2 kg/ha				
2 trattamenti a distanza di 10 giorni nella fase di ingrossamento fittone						

FOGLIARE

Indicazioni generali di nutrizione della coltura

La carota è una coltura potassofila che si avvantaggia di una buona concimazione potassica sia radicale che fogliare (**MAGYK ZM**).

E' importante non eccedere con la concimazione azotata, in particolare nelle semine estive, per evitare eccessi di vigoria che possono provocare cali produttivi e problemi durante la raccolta.



ARPA Speciali srl, via Cremona 27/5 – 46100 Mantova tel. 0376 262483 info@arpaspeciali.com

SOLO PER USO INTERNO. VIETATA OGNI RIPRODUZIONE. Le indicazioni sopra riportate sono indicative e Arpa Speciali srl si riserva di apportare in qualsiasi momento senza preavviso le modifiche che ritenesse utili per qualsiasi esigenza tecnica commerciale e/o legislativa. Arpa Speciali srl non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni o esiti parziali derivanti da impieghi non corretti o difformi dalle Buone Pratiche Agricole e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite circa l'utilizzo dei propri prodotti. **v200311**