GIRASOLE

Resa produttiva: **35-40 q.li/ha acheni**

Asportazione teorica elementi nutritivi (kg/q.le acheni)**:** **N 5,0 • P2O5 1,91 • K2O 9,7**

Importanza degli elementi nutritivi per la coltura

Boro (B)	Rame (Cu)	Ferro (Fe)	Manganese (Mn)	Molibdeno (Mo)	Zinco (Zn)	Magnesio (Mg)	Calcio (Ca)	Zolfo (S)	Potassio (K)
XXX	**X**	**X**	**XX**	**X**	**XX**	**X**	**X**	**X**	**XX**

Interventi specifici

Obiettivo	Prodotti	Dose	Epoca di utilizzo: 4-5 paia di foglie	Bottone fiorale	Inizio fioritura	Fioritura	Maturazione
APPORTO DI BORO FOGLIARE	**BORONPLUS**	1,5-2 lt/ha	■	■			
	1-2 interventi dalla fase di 5 paia di foglie fino a bottone fiorale						
PER UNA MIGLIORE FIORITURA E UNA MAGGIORE PRODUZIONE	**CUAJEMAX**	1 kg/ha		■	■		
	FULVIN	2 lt/ha		■	■		
	1 intervento prima della fioritura.						
PER STIMOLARE LA FOTOSINTESI E AUMENTARE IL PESO SECCO E LA RESA	**K-LEAF o MAGYK ZM**	6-10 kg/ha			■	■	■
	FULVIN	2 lt/ha			■	■	■
	1-2 interventi da inizio fioritura						

FOGLIARE

Indicazioni generali di nutrizione della coltura

Il girasole ha elevate esigenze in boro (**BORONPLUS**), è importante intervenire precocemente con interventi fogliari nel caso di condizioni predisponenti la carenza del microelemento (pH sub alcalini 7,5-8,5, terreni sabbiosi, scarso contenuto in sostanza organica, condizioni di siccità).



ARPA Speciali srl, via Cremona 27/5 – 46100 Mantova tel. 0376 262483 info@arpaspeciali.com

SOLO PER USO INTERNO. VIETATA OGNI RIPRODUZIONE. Le indicazioni sopra riportate sono indicative e Arpa Speciali srl si riserva di apportare in qualsiasi momento senza preavviso le modifiche che ritenesse utili per qualsiasi esigenza tecnico commerciale e/o legislativa. Arpa Speciali srl non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni o esiti parziali derivanti da impieghi non corretti o difformi dalle Buone Pratiche Agricole e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite circa l'utilizzo dei propri prodotti. **v160101**