MAIS

Resa produttiva: **130-180 q.li/ha granella**
700-750 q.li/ha trinciato

Asportazione teorica elementi nutritivi (kg/q.le)**:** **N 2,2 • P2O5 0,94 • K2O 2,08 granella**
N 0,37 • P2O5 0,16 • K2O 0,35 trinciato

Importanza degli elementi nutritivi per la coltura

Boro (B)	Rame (Cu)	Ferro (Fe)	Manganese (Mn)	Molibdeno (Mo)	Zinco (Zn)	Magnesio (Mg)	Calcio (Ca)	Zolfo (S)	Potassio (K)
xx	**xx**	**x**	**xx**	**x**	**xxx**	**x**	**x**	**x**	**xx**

Aziende con impianto di fertirrigazione

CONCIMAZIONE GRANULARE IN PRE-SEMINA

NP 18.46 200-300 kg/ha

IN FERTIRRIGAZIONE

fase fenologica	prodotto	dose (kg/ha) intervento	note
Dalla fase di 7-8 foglie	**UNISAVE26.12.12 o UNIBAG 24.6.12** **+** **Nitrato Ammonico 34%**	25-30 25-30	Interventi settimanali per 10-12 settimane
Post fioritura	**UNISAVE 15.6.25 o UNIBAG 14.7.28**	50	2 Interventi nella fase di formazione della granella

ARPA Speciali srl, via Cremona 27/5 – 46100 Mantova tel. 0376 262483 info@arpaspeciali.com
SOLO PER USO INTERNO. VIETATA OGNI RIPRODUZIONE. Le indicazioni sopra riportate sono indicative e Arpa Speciali srl si riserva di apportare in qualsiasi momento senza preavviso le modifiche che ritenesse utili per qualsiasi esigenza tecnico commerciale e/o legislativa. Arpa Speciali srl non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni o esiti parziali derivanti da impieghi non corretti o difformi dalle Buone Pratiche Agricole e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite circa l'utilizzo dei propri prodotti. **v160101**

Interventi specifici

Obiettivo	Prodotti	Dose	Epoca di utilizzo				
			2-4 foglie	6-10 foglie	Levata	Spigatura - fioritura	Riempimento cariossidi
APPORTO DI ZINCO PER VIA FOGLIARE	**EKOKEL ZIN**	1-3 kg/ha					
	1 trattamento nella fase iniziale dalle 3 alle 6 foglie sviluppate						
APPORTO DI POTASSIO PER VIA FOGLIARE	**K-LEAF**	10-12 kg/ha					
	1 intervento nella fase di massimo assorbimento del potassio (5-6 foglie)						

FOGLIARE

Indicazioni generali di nutrizione della coltura

Lo zinco è il microelemento più importante per la coltura del mais.
In particolare nelle prime fasi di sviluppo e in presenza di condizioni di basse temperature del terreno e suoli asfittici possono insorgere sintomi di carenza, ed è importante intervenire per via fogliare con prodotti ad elevato contenuto di zinco chelato (**EKOKEL ZIN**).



ARPA Speciali srl, via Cremona 27/5 – 46100 Mantova tel. 0376 262483 info@arpaspeciali.com
SOLO PER USO INTERNO. VIETATA OGNI RIPRODUZIONE. Le indicazioni sopra riportate sono indicative e Arpa Speciali srl si riserva di apportare in qualsiasi momento senza preavviso le modifiche che ritenesse utili per qualsiasi esigenza tecnico commerciale e/o legislativa. Arpa Speciali srl non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni o esiti parziali derivanti da impieghi non corretti o difformi dalle Buone Pratiche Agricole e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite circa l'utilizzo dei propri prodotti. **v160101**