RANUNCOLO

Importanza degli elementi nutritivi per la coltura

Boro (B)	Rame (Cu)	Ferro (Fe)	Manganese (Mn)	Molibdeno (Mo)	Zinco (Zn)	Magnesio (Mg)	Calcio (Ca)	Zolfo (S)	Potassio (K)
XXX	**X**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XXX**	**X**	**XX**

Aziende con impianto di fertirrigazione

CONCIMAZIONE GRANULARE

HUMIVITA PLUS GR **60 kg/1000 mq** dopo la disinfezione

QROP MIX 10.14.23 + 2 **30 Kg/1000mq**

IN FERTIRRIGAZIONE

In base all'analisi dell'acqua, impostare la soluzione nutritiva ideale

oppure

fase fenologica	obiettivo	prodotto		dose (kg/1000mq) intervento	note
Post-trapianto	Sviluppo radicale	**Nitrato di calcio** + **LIBAMIN MIX** + **TARSSAN**		1,5-2 2 0,2	A una settimana dal trapianto. Effettuare 1-2 interventi a seconda della necessità.
Allevamento pianta	Favorire lo sviluppo vegetativo.	**UNISOL 24.6.12** + **FULVIN**	**ULTRASOL 24.6.12** + **FULVIN**	1,5-2 1-1,5	Interventi settimanali alternando gli interventi
		alternare con			
		CALCISOL + **FULVIN** + **TARSSAN**		1,5-2 2 0,2	
Inizio formazione dei bottoni fiorali - raccolta	Favorire lo sviluppo equilibrato e l'accrescimento dei bottoni fiorali	**UNISOL 15.5.30** + **MAGASUL** + **FULVIN**	**ULTRASOL 13.5.30** + **MAGASUL** + **FULVIN**	1,5-2 1 1	Interventi settimanali dei due prodotti
		alternare con			
		CALCISOL + **TARSSAN**		1,5-2 0,2	

pH: 5,5-6,5 - **EC** (ms/cm): 1,7-1,8

ARPA Speciali srl, via Cremona 27/5 – 46100 Mantova tel. 0376 262483 info@arpaspeciali.com

SOLO PER USO INTERNO. VIETATA OGNI RIPRODUZIONE. Le indicazioni sopra riportate sono indicative e Arpa Speciali srl si riserva di apportare in qualsiasi momento senza preavviso le modifiche che ritenesse utili per qualsiasi esigenza tecnico commerciale e/o legislativa. Arpa Speciali srl non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni o esiti parziali derivanti da impieghi non corretti o difformi dalle Buone Pratiche Agricole e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite circa l'utilizzo dei propri prodotti. **v200311**

Interventi specifici

Obiettivo	Prodotti	Dose	Epoca di utilizzo: Post trapianto	Sviluppo vegetativo	Bottoni fiorali	Sviluppo fiori	Raccolta
PER FAVORIRE LA FIORITURA	**CUAJEMAX**	200 gr /1000 mq					
	LIBAMIN AA	250 cc /1000 mq					
	Un intervento in fertirrigazione ogni 2 settimane da fine accestimento						
PER AUMENTARE IL COLORE, LA CONSISTENZA E LA DIMENSIONE DEL BOCCIOLO	**ENGORMAX**	100 gr/hl					
	CALCYPRO	200 cc/hl					
	Interventi fogliari dall'inizio della fioritura ogni 15 giorni fino a fine ciclo						
PER FAVORIRE L'ATTIVITA' METABOLICA DELLA PIANTA IN CASO DI STRESS CLIMATICI. Basse temperature	**JISAMAR o GLYBET**	350 cc /1000 mq					
	VEGETAMIN ECO	500 cc /1000 mq					
	Interventi ripetuti durante tutto il ciclo colturale, in particolare con condizioni climatiche avverse						

FOGLIARE **FERTIRRIGAZIONE**

Indicazioni generali di nutrizione della coltura

Carenze di calcio provocano deformazione e svuotamento dei gambi, steli fiorali deboli e deformati. Una fertirrigazione equilibrata con un rapporto K:Mg:Ca ottimale è fondamentale.
ENGORMAX aumenta la dimensione dei fiori e la colorazione ed apporta calcio in forma chelata EDTA.
Carenze di boro causano malformazioni dei boccioli fiorali e dello stelo al di sotto del bocciolo.
CUAJEMAX apporta elementi nutritivi che incidono attivamente sull'induzione a fiore come boro, molibdeno, fosforo e un estratto puro di alghe.

ARPA Speciali srl, via Cremona 27/5 – 46100 Mantova tel. 0376 262483 info@arpaspeciali.com
SOLO PER USO INTERNO. VIETATA OGNI RIPRODUZIONE. Le indicazioni sopra riportate sono indicative e Arpa Speciali srl si riserva di apportare in qualsiasi momento senza preavviso le modifiche che ritenesse utili per qualsiasi esigenza tecnico commerciale e/o legislativa. Arpa Speciali srl non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni o esiti parziali derivanti da impieghi non corretti o difformi dalle Buone Pratiche Agricole e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite circa l'utilizzo dei propri prodotti. **v200311**