



## VITE DA VINO – uve rosse

**Asportazione teorica elementi nutritivi (kg/ha):**

**N 50-60•P2O5 25-30•K2O 80-100**

Importanza degli elementi nutritivi per la coltura

| Boro (B) | Rame (Cu) | Ferro (Fe) | Manganese (Mn) | Molibdeno (Mo) | Zinco (Zn) | Magnesio (Mg) | Calcio (Ca) | Zolfo (S) | Potassio (K) |
|----------|-----------|------------|----------------|----------------|------------|---------------|-------------|-----------|--------------|
| XXX      | X         | XXX        | XX             | X              | XX         | XXX           | XX          | X         | XXX          |

### Aziende CON impianto di fertirrigazione

CONCIMAZIONE GRANULARE A FINE INVERNO

**UNISLOW 15.7.21 + 4**

100-150 kg/ha

Oppure

**QROP MIX 10.14.23 + 2 o QROP COMPLEX 12.6.24+ 2 + micro**

100-150 kg/ha

IN FERTIRRIGAZIONE

| fase fenologica   | prodotto  |   | dose (kg/ha) intervento | note                               |
|---|---|---|-------------------------|------------------------------------|
| Apertura gemme – foglie distese (da metà marzo a fine aprile)                   | <b>UNISOL 10.40.10</b><br>+<br><b>HUMILIG 8/8</b> | <b>ULTRASOL 11.42.11</b><br>+<br><b>HUMILIG 8/8</b> | 20-25<br>10-20          | 2 interventi nell'arco del periodo |
| Fino a prefioritura (da fine aprile a fine maggio)                              | <b>UNISOL 20.20.20</b>                            | <b>ULTRASOL 18.18.18</b>                            | 20-25                   | 2 interventi nell'arco del periodo |
| Fioritura-allegagione (da fine maggio a metà giugno)                            | <b>UNISOL 15.5.30</b><br>+<br><b>MAGANIT</b>      | <b>ULTRASOL 13.5.30</b><br>+<br><b>MAGANIT</b>      | 20-25<br>5-10           | 2 interventi nell'arco del periodo |
| Accrescimento acini - pre chiusura grappolo (da metà giugno ai primi di luglio) | <b>UNISOL 15.5.30</b><br>+<br><b>MAGANIT</b>      | <b>ULTRASOL 13.5.30</b><br>+<br><b>MAGANIT</b>      | 10-15<br>5-10           | 2 interventi nell'arco del periodo |
| Chiusura grappolo – invaiatura (da inizio luglio a metà agosto)                 | <b>UNISOL 15.5.30</b><br>+<br><b>MAGANIT</b>      | <b>ULTRASOL 13.5.30</b><br>+<br><b>MAGANIT</b>      | 10-15<br>5-10           | 1 intervento nell'arco del periodo |
| Post raccolta   | <b>UNISOL 15.5.30</b>                             | <b>ULTRASOL 13.5.30</b>                             | 20-25                   | 2 interventi dopo la raccolta      |

**ARPA Speciali srl**, via Cremona 27/5 – 46100 Mantova tel. 0376 262483 [info@arpaspeciali.com](mailto:info@arpaspeciali.com)

**SOLO PER USO INTERNO. VIETATA OGNI RIPRODUZIONE.** Le indicazioni sopra riportate sono indicative e Arpa Speciali srl si riserva di apportare in qualsiasi momento senza preavviso le modifiche che ritenesse utili per qualsiasi esigenza tecnico commerciale e/o legislativa. Arpa Speciali srl non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni o esiti parziali derivanti da impieghi non corretti o difformi dalle Buone Pratiche Agricole e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite circa l'utilizzo dei propri prodotti. **v200311**



## Interventi specifici

| Obiettivo  | Prodotti   | Dose     | Epoca di utilizzo    |              |           |             |                   |                         |               |
|--|--|----------|----------------------|--------------|-----------|-------------|-------------------|-------------------------|---------------|
|  |  |          | Risveglio vegetativo | Prefioritura | Fioritura | Allegagione | Chiusura grappolo | Invaiaura - maturazione | Post-raccolta |
| IN PREVENZIONE DELLA CLOROSI FERRICA   | FERRONOVE  | 5 kg/ha  |                      |              |           |             |                   |                         |               |
|  | HUMILIG 8-8  | 20 lt/ha |                      |              |           |             |                   |                         |               |
|  | Da germogliamento a prefioritura 1-2 interventi                          |          |                      |              |           |             |                   |                         |               |
| IN PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA CLOROSI (INGIALLIMENTO)                                    | UNIRON FOL   | 1 kg/ha  |                      |              |           |             |                   |                         |               |
|  | FULVIN   | 2 lt/ha  |                      |              |           |             |                   |                         |               |
|  | Da germogliamento all'allegagione 2 interventi a distanza di 7-10 giorni |          |                      |              |           |             |                   |                         |               |
| CARENZE MULTIPLE DI MICROELEMENTI  | SPINNER  | 1 kg/ha  |                      |              |           |             |                   |                         |               |
|  | FULVIN   | 2 lt/ha  |                      |              |           |             |                   |                         |               |
| AUMENTO DIFESE ENDOGENE  | UNIPHOS K  | 3 lt/ha  |                      |              |           |             |                   |                         |               |
| PER MIGLIORARE LA FIORITURAE LA FECONDAZIONE. RIDUZIONE ACINELLATURA                         | UNIMAR   | 1 kg/ha  |                      |              |           |             |                   |                         |               |
|  | GLYBET   | 2 lt/ha  |                      |              |           |             |                   |                         |               |
|  | BORONPLUS  | 1 lt/ha  |                      |              |           |             |                   |                         |               |
| 2 interventi a grappoli separati e bottoni fiorali. Eventualmente un terzo in post fioritura |  |          |                      |              |           |             |                   |                         |               |
| APPORTO NUTRITIVO EQUILIBRATO DURANTE IL CICLO COLTURALE                                     | UNISPRAY 20.20.20  | 2 kg/ha  |                      |              |           |             |                   |                         |               |
|  | FULVIN   | 2 lt/ha  |                      |              |           |             |                   |                         |               |
|  | Interventi in prefioritura e post fioritura                              |          |                      |              |           |             |                   |                         |               |
| IN PREVENZIONE DISSECCAMENTO DEL RACHIDE E APPORTO DI CALCIO                                 | CALCYMAG   | 2 lt/ha  |                      |              |           |             |                   |                         |               |
|  | GLYBET   | 2 lt/ha  |                      |              |           |             |                   |                         |               |
|  | 2-3 trattamenti dopo l'allegagione fino a invaiatura ogni 15 giorni      |          |                      |              |           |             |                   |                         |               |
| AUMENTO GRADO ZUCCHERINO E PREVENZIONE DISSECCAMENTO DEL RACHIDE                             | MAGYK ZM   | 5 Kg/ha  |                      |              |           |             |                   |                         |               |
|  | GLYBET   | 2 lt/ha  |                      |              |           |             |                   |                         |               |
|  | Da allegagione alla raccolta eseguire trattamenti ogni 15 giorni         |          |                      |              |           |             |                   |                         |               |
| POST RACCOLTA PER FAVORIRE LA MATURAZIONE DELLE GEMME  | UNIZIM   | 5 kg/ha  |                      |              |           |             |                   |                         |               |
|  | BORONPLUS  | 1 lt/ha  |                      |              |           |             |                   |                         |               |
|  | 1-2 interventi dopo la vendemmia   |          |                      |              |           |             |                   |                         |               |

**FOGLIARE**
**FERTIRRIGAZIONE**

Gemma cotonosa

Foglie distese

Grappoli separati

Bottoni fiorali separati

Fioritura

Allegagione

Chiusura grappolo

Invaiaura

Maturazione

Post raccolta


 ARPA Speciali srl, via Cremona 27/5 – 46100 Mantova tel. 0376 262483 [info@arpaspeciali.com](mailto:info@arpaspeciali.com)

SOLO PER USO INTERNO. VIETATA OGNI RIPRODUZIONE. Le indicazioni sopra riportate sono indicative e Arpa Speciali srl si riserva di apportare in qualsiasi momento senza preavviso le modifiche che ritenesse utili per qualsiasi esigenza tecnica commerciale e/o legislativa. Arpa Speciali srl non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni o esiti parziali derivanti da impieghi non corretti o difformi dalle Buone Pratiche Agricole e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite circa l'utilizzo dei propri prodotti. v200311